

Walter Sassi, Edoardo Manfredini

PRIMA INDAGINE SULL'AVIFAUNA PRESENTE NELL'OASI URBANA WWF "IL CALOGGIO" DI BOLLATE (MILANO)

L'oasi urbana WWF "Il Caloggio" è situata nella periferia del comune di Bollate all'interno del Parco Regionale delle Groane. Nell'area sono presenti sorgenti e canalizzazioni di due vecchi fontanili non più attivi, circondati da formazioni forestali e porzioni di terreni agricoli, lasciati per un certo periodo incolti.

La fascia boscata è formata da essenze ad alto fusto tipiche dei boschi di pianura come Farnia *Quercus pedunculata*, Carpino bianco *Carpinus betulus*, Castagno *Castanea sativa*, Betulla *Betula pendula* e specie arbustive come Rosa canina *Rosa canina*, Sanguinella *Cornus sanguinea* e Prugnolo *Prunus spinosa*.

Nell'area in questione è presente anche una piccola zona umida ed il secondario inattivo del canale Villoresi.

Metodi

Il presente studio, iniziato nel dicembre del 2005 durante i rilievi eseguiti nell'ambito del progetto Groane report (Sassi e coll. 2004-2008), è attualmente ancora in atto. Precedentemente le osservazioni sull'avifauna, effettuate dagli attivisti della locale sezione WWF che gestiscono l'area, risultando sporadiche, non consentivano di conoscere a fondo la comunità di uccelli.

A partire dal dicembre 2005 e fino al dicembre 2007 i rilievi sono stati effettuati percorrendo regolarmente transetti lungo i quali il riconoscimento delle specie avveniva mediante ascolto dei canti e mediante uso di binocoli, quando si rendeva necessaria una identificazione visiva.

Per la valutazione della fenologia è stata utilizzata la nomenclatura proposta da Brichetti e Massa (1998) aggiornata secondo il nuovo sistema di categorizzazione adottato dall'AERC (*Association of European Records and Rarities Committees*) e proposto dal CISO-COI (2004). In particolare, una specie è stata considerata svernante (W) se presente nel periodo compreso tra la terza decade di dicembre e il 15 di febbraio, come estivante (E) se osservata tra il primo luglio e la prima decade di agosto e occasionale (O) se osservata all'interno dell'area una sola volta nell'arco del biennio.

Risultati

Allo stato attuale sono state censite 60 specie, di cui 35 svernanti (W), 2 estivanti (E), 38 migratrici (M) e 4 occasionali (O). Le specie censite appartengono a 27 famiglie. Di queste quella più rappresentata è costituita dai *Fringillidae* con 6 specie.

Checklist delle specie osservate e fenologia

- Germano reale *Anas platyrhynchos*: O
 Fagiano *Phasianus colchicus*: SB
 Airone cenerino *Ardea cinerea*: O
 Nitticora *Nycticorax nycticorax*: E
 Sparviere *Accipiter nisus*: SBMW
 Poiana *Buteo buteo*: S
 Gheppio *Falco tinnunculus*: S
 Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*: O
 Beccaccia *Scolopax rusticola*: MW
 Piccione domestico *Columba livia*: SBW
 Colombaccio *Columba palumbus*: BM
 Tortora *Streptopelia turtur*: BM
 Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*:
 SBW
 Cuculo *Cuculus canorus*: BM
 Allocco *Strix aluco*: SW
 Civetta *Athene noctua*: SW
 Rondone *Apus apus*: E
 Martin pescatore *Alcedo atthis*: B(1)O
 Picchio rosso maggiore *Dendrocopos
 major*: SBW
 Picchio verde *Picus viridis*: SBW
 Rondine *Hirundo rustica*: BM
 Balestruccio *Delichon urbicum*: BM
 Ballerina bianca *Motacilla alba*: S
 Regolo *Regulus regulus*: MW
 Fiorrancino *Regulus ignicapillus*: MW
 Scricciolo *Troglodytes troglodytes*:
 SBMW
 Passera scopaiola *Prunella modularis*:
 MW
 Merlo *Turdus merula*: SBMW
 Cesena *Turdus pilaris*: M
 Tordo sassello *Turdus iliacus*: M
 Tordo bottaccio *Turdus philomelos*: M
 Lui grosso *Philoscopus trochilus*: M
- Lui piccolo *Philoscopus collybita*:
 SBMW
 Capinera *Sylvia atricapilla*: SBMW
 Pigliamosche *Muscicapa striata*: BM
 Balia nera *Ficedula hipoleuca*: M
 Pettiroso *Erithacus rubecula*: SBMW
 Usignolo *Luscinia megarhynchos*: BM
 Codirosso spazzacamino *Phoenicurus
 ochruros*: SBMW
 Codirosso *Phoenicurus phoenicurus*: BM
 Codibugnolo *Aegithalos caudatus*:
 SBMW
 Cincia bigia *Parus palustris*: SBMW
 Cincia mora *Parus ater*: MW
 Cincialegra *Parus major*: SBMW
 Cinciarella *Parus caeruleus*: SBMW
 Picchio muratore *Sitta europaea*:
 SBMW
 Rampichino *Certhia brachydactyla*:
 SBMW
 Rigogolo *Oriolus oriolus*: M
 Ghiandaia *Garrulus glandarius*: SBW
 Gazza *Pica pica*: SBMW
 Cornacchia *Corvus corone*: SBW
 Storno *Sturnus vulgaris*: SBMW
 Passera europea *Passer domesticus*:
 SBW
 Passera mattugia *Passer montanus*:
 SBW
 Fringuello *Fringilla coelebs*: SBMW
 Peppola *Fringilla montifringilla*: MW
 Verdone *Carduelis chloris*: SBMW
 Lucherino *Carduelis spinus*: MW
 Cardellino *Carduelis carduelis*:
 SBMW
 Verzellino *Serinus serinus*:

Abstract

The Birds of the WWF Urban Oasis “Il Caloggio” (Bollate, Milano province, Italy).

The authors have observed the present birds in the Oasis “Il Caloggio di Bollate”, Milano province (Northern Italy), managed by the local WWF. The study was carried out from December 2005 until December 2007.

Ricevuto marzo 2008

Walter Sassi - Ricerche Ornitoculturali
Via Cavour 32 - 20030 Lentate sul Seveso MI
www.ornitocultura.com
E-mail: ornitocultura@alice.it

Edoardo Manfredini
Via Isarco 3 - Limbiate MI
WWF Italia, Sez. Groane

Bibliografia

- Brichetti P. Massa B. 1998. Checklist degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.* 68: 129-152.

